

매우 드물게 나타납니다

코흐 현상이란?



비시지 접종 바늘 자국은 보통 접종 후 10일 전후까지 아무런 반응이 나타나지 않습니다. 그러나 극히 드물게는 접종 부위가 아래와 같이 접종 후 이른 시기에 변화를 나타내는 일이 있습니다. 이것을 <코흐현상> 이라고 합니다.



1
接種後 2日

접종 후 2일
접종 후 3일
정도까지 심한
변화가 일어나는
경우가 많다.



2
接種後 5日

접종 후 5일
변화가 조금씩
안정되어 간다



3
接種後 7日

접종 후 7일
바늘 자국이
나날이
나아간다



4
接種後 48日

접종 후 48일:
바늘 자국이
거의
깨끗해진다

코흐현상의 특징 접종 후 3일 이내의 급격한 변화(염증, 화농 등)와 빠른 치유

만약 코흐현상이 일어나면?

Point 1

변화를 발견하면 2-3일 이내에 반드시 접종한 병원에 가서 상담하십시오
이 변화(코흐현상)가 나오는 경우, 자녀분이 이미 결핵에 감염되었을 가능성이 있습니다. 정말로 감염되어 있는지 이진지를 확인하기 위해 제대로 진찰이나 검사를 받을 필요가 있습니다. 집단 접종인 경우나, 접종한 의사와 연락이 되지 않는 경우에는 보건소(시읍면)에 연락해 주십시오. 다만 응급 진료를 받을 만큼 서두를 필요는 없습니다. 또한, 현재 어린이가 결핵에 걸리는 일은 극히 보기 드물기 때문에, 검사는 어디까지나 만약을 위해서 하는 것이니까 별로 걱정하지 말아주십시오

Point 2

접종 2-4 주 후에는 부기가 가라앉습니다
접종 부위의 피부가 붉게 붓고 고름이 생기는 변화를 볼 수 있는 경우에도 가제를 붙이는 등의 처치를 할 필요는 없습니다. 접종 2-4 주 후에는 바늘 자국만 남는 정도로 안정됩니다.

그렇지만
당황하지마

